

## 泌尿器科 がん化学療法レジメン

がん種	レジメン名	薬剤名(略称・商品名)	1日投与量	用法	投与時間	投与日	1コース期間 (インターバル)	備考
尿路上皮がん	GEM+CDDP(GC)療法	ゲムシタビン (GEM)	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	Day 1,8,15	28日	
		シスプラチン (CDDP)	70 mg/m <sup>2</sup>	点滴	3時間	Day 2		
	GEM+CBDCA療法	ゲムシタビン (GEM)	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	Day 1,8,15	28日	
		カルボプラチン (CBDCA)	AUC 5	点滴	2時間	Day 2		
GEM単独療法	ゲムシタビン (GEM)	1000 mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	Day 1,8,15	28日		
尿路上皮がん 腎細胞がん	ペムブロリズマブ療法	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	200 mg/body	点滴	30分	Day 1	21日	腎細胞がん術後補助の 投与期間は12か月まで
尿路上皮がん 腎細胞がん	ニボルマブ療法	ニボルマブ (Nivo)(オプジーホ)	240 mg/body	点滴	30分	Day 1	14日	尿路上皮がん術後補助 の投与期間は12か月まで
前立腺がん	ドセタキセル療法	ドセタキセル (DTX)	75 mg/m <sup>2</sup>	点滴	1時間	Day 1	21日	転移性・去勢抵抗性
	カバジタキセル療法	カバジタキセル (シエフタ) プレドニゾン (プレドニ)	25 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/body	点滴 経口	1時間	Day 1 Day 1~21	21日	転移性・去勢抵抗性